

## Isolierungsschema UKJ (siehe auch Hygiene-Merkblätter UMR)

	Influenza	RSV/HMPV	Pertussis
<b>Isolierung</b>	Bereits bei Verdacht erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
<b>Kohortierung</b>	Möglich	Möglich	Möglich
<b>Isolierungsdauer</b>	In der Regel bis 7 Tage	8 Tage	Bis 5 Tage nach Beginn einer wirksamen Therapie
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Medizinische Einmalhandschuhe</b>	Standard	Bei Kontakt mit erregerehaltigen Material Bei <b>direktem</b> Patientenkontakt	Standard
<b>Schutzbrille</b>	Erforderlich bei Intubationen, Absaugung	Erforderlich bei Verdacht bzw. nachgewiesener Infektion	
<b>Mund-Nasen-Schutz Atemmasken</b>	<u>Personal</u> Mund-Nasen-Schutz Bei Tätigkeiten mit Aerosolbildung FFP2 <u>Patient</u> Mund-Nasen-Schutz	Bei engem Kontakt	Erforderlich (auch für geimpfte Personen)
<b>Schutzkittel</b>	Bei Betreten des Patientenzimmers	Bei Kontakt mit erregerehaltigen Material Bei <b>direktem</b> Patientenkontakt	Bei Kontakt mit erregerehaltigen Material/Gegenständen Bei <b>direktem</b> Patientenkontakt
<b>Flächendesinfektion</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Wäsche</b>	Entsorgung im Zimmer „infektiöse Wäsche“	Standard	Standard
<b>Geschirr</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Medizinprodukte</b> (z. B. Pflege-Untersuchungsmaterial)	Patientenbezogen einsetzen. Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen.		
<b>Abfall</b>	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung



**Isolierungsschema UKJ (siehe auch Hygiene-Merkblätter UMR)**

	<b>Varizellen/Herpes Zoster</b>	<b>Masern</b>	<b>Viral bedingte Enteritiden (Noro/Rota/Adeno)</b>
<b>Isolierung</b>	<u><b>Varizellen</b></u> Erforderlich <u><b>Herpes Zoster</b></u> Erforderlich bei abwehr- geschwächten Personen, ansonsten Standardhygiene bei abgedeckten Läsionen	Bereits bei Verdacht erforderlich	Bereits bei Verdacht erforderlich
<b>Kohortierung</b>	Möglich	Möglich	Möglich
<b>Isolierungsdauer</b>	<u><b>Varizellen</b></u> Erforderlich bis zum Abtrocknen der Bläschen	5 Tage nach Auftreten des Exanthems	Bis 48 Stunden nach Abklingen klinischer Symptome
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Standard	Standard	Viruzides Desinfektionsmittel! z. B. Desderman pure 30 Sekunden
<b>Medizinische Einmalhandschuhe</b>	<u><b>Varizellen</b></u> Erforderlich bei Kontakt mit erregerhaltigen Material, bei <b>direktem</b> Patientenkontakt	Standard	Standard
<b>Mund-Nasen-Schutz Atemmasken</b>	<u><b>Varizellen</b></u> Bei immunem Personal nicht erforderlich Bei <b>nicht</b> immunem Personal erforderlich Schutzbrille sinnvoll	Bei immunem Personal nicht erforderlich Bei <b>nicht</b> immunem Personal erforderlich Ggf. Schutzbrille	Bei Kontakt mit erbrechendem Patient
<b>Schutzkittel</b>	Bei Kontakt mit kontaminierten Material Bei <b>direktem</b> Patientenkontakt	Bei Betreten des Patientenzimmers	Bei Kontakt mit erregerhaltigen Material Bei <b>direktem</b> Patientenkontakt
<b>Flächendesinfektion</b>	Standard (ca. 30 min nach dem Bettenmachen)	Standard	0,8 % Dismozon plus bzw. 2 % Terralin protect
<b>Wäsche</b>	Standard	Standard	Entsorgung im Zimmer "Infektiöse" Wäsche
<b>Geschirr</b>	Standard	Standard	<u><b>Beim Ausbruch</b></u> Aufbereitung beim Caterer bzw. Aufbereitung bei 93°C
<b>Medizinprodukte</b>	Patientenbezogen einsetzen. Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen.		
<b>Abfall</b>	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung