

Isolierungsschema UKJ (siehe auch Hygiene-Merkblätter UMR)

	Influenza	RSV/HMPV	Pertussis
Isolierung	Bereits bei Verdacht erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Kohortierung	Möglich	Möglich	Möglich
Isolierungsdauer	In der Regel bis 7 Tage	8 Tage	Bis 5 Tage nach Beginn einer wirksamen Therapie
Hygienische. Händedesinfektion	Standard	Standard	Standard
Keimarme Handschuhe	Standard	Bei Kontakt mit erregerehaltigen Material Bei direktem Patientenkontakt	Standard
Schutzbrille	Erforderlich bei Intubationen, Absaugung	Erforderlich bei Verdacht bzw. nachgewiesener Infektion	
Mund-Nasen-Schutz Atemmasken	<u>Personal</u> Mund-Nasen-Schutz Bei Tätigkeiten mit Aerosolbildung FFP2 <u>Patient</u> Mund-Nasen-Schutz	Bei engem Kontakt	Erforderlich (auch für geimpfte Personen)
Schutzkittel	Bei Betreten des Patientenzimmers	Bei Kontakt mit erregerehaltigen Material Bei direktem Patientenkontakt	Bei Kontakt mit erregerehaltigen Material/Gegenständen Bei direktem Patientenkontakt
Flächendesinfektion	Standard	Standard	Standard
Wäsche	Entsorgung im Zimmer „infektiöse Wäsche“	Standard	Standard
Geschirr	Standard	Standard	Standard
Medizinprodukte (z. B. Pflege-Untersuchungsmaterial)	Patientenbezogen einsetzen. Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen.		
Abfall	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung

Isolierungsschema UKJ (siehe auch Hygiene-Merkblätter UMR)

	Varizellen/Herpes Zoster	Masern	Viral bedingte Enteritiden (Noro/Rota/Adeno)
Isolierung	<u>Varizellen</u> Erforderlich <u>Herpes Zoster</u> Erforderlich bei abwehrgeschwächten Personen, ansonsten Standardhygiene bei abgedeckten Läsionen	Bereits bei Verdacht erforderlich	Bereits bei Verdacht erforderlich
Kohortierung	Möglich	Möglich	Möglich
Isolierungsdauer	<u>Varizellen</u> Erforderlich bis zum Abtrocknen der Bläschen	5 Tage nach Auftreten des Exanthems	Bis 48 Stunden nach Abklingen klinischer Symptome
Hygienische Händedesinfektion	Standard	Standard	Viruzides Desinfektionsmittel! z. B. Desderman pure 30 Sekunden
Keimarme Handschuhe	<u>Varizellen</u> Erforderlich bei Kontakt mit erregerrhaltigen Material, bei direktem Patientenkontakt	Standard	Standard
Mund-Nasen-Schutz Atemmasken	<u>Varizellen</u> Bei immunem Personal nicht erforderlich Bei nicht immunem Personal erforderlich Schutzbrille sinnvoll	Bei immunem Personal nicht erforderlich Bei nicht immunem Personal erforderlich Ggf. Schutzbrille	Bei Kontakt mit erbrechendem Patient
Schutzkittel	Bei Kontakt mit kontaminierten Material Bei direktem Patientenkontakt	Bei Betreten des Patientenzimmers	Bei Kontakt mit erregerrhaltigen Material Bei direktem Patientenkontakt
Flächendesinfektion	Standard (ca. 30 min nach dem Bettenmachen)	Standard	0,8 % Dismozon plus bzw. 2 % Terralin protect
Wäsche	Standard	Standard	Entsorgung im Zimmer "Infektiöse" Wäsche
Geschirr	Standard	Standard	<u>Beim Ausbruch</u> Aufbereitung beim Caterer bzw. Aufbereitung bei 93°C
Medizinprodukte	Patientenbezogen einsetzen. Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen.		
Abfall	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung