



**Isolierungsschema UMR** (siehe auch Hygiene-Merkblätter UMR)

	<b>MRSA</b>	<b>MRGN</b>
<b>Isolierung</b>	In der Regel erforderlich, nach Rücksprache mit der Krankenhaushygiene Barrierepflege möglich	Verschiedene Varianten (siehe HMB)
<b>Kohortierung</b>	Möglich	Möglich
<b>Entisolierung</b>	Nach 3 negativen Kontrollabstrichen	Siehe HMB
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Standard	Standard
<b>Keimarme Handschuhe</b>	Standard	Standard
<b>Mund-Nasen-Schutz Atemmasken</b>	Bei direktem Kontakt zu nasal/pharyngeal besiedelten Patienten Beim Bettenmachen aller MRSA-Patienten	Bei Besiedelung der Atemwege
<b>Schutzkittel</b>	Bei Kontakt mit kontaminierten Gegenständen (z. B. Bett) Bei <b>direktem</b> Patientenkontakt	Bei Kontakt mit erregerhaltigem Material, Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen, Sekreten
<b>Flächendesinfektion</b>	Standard	Standard
<b>Wäsche</b>	Entsorgung im Zimmer	Entsorgung im Zimmer
<b>Geschirr</b>	Standard	Standard
<b>Medizinprodukte</b> (z. B. Pflege-, Untersuchungsmaterial)	Patientenbezogen einsetzen Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen	Patientenbezogen einsetzen Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen
<b>Abfall</b>	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung

HMB Hygienemerklblatt  
 HHD Hygienische Händedesinfektion  
 CDAD *Clostridioides difficile* assoziierte Diarrhoe

Tbc Tuberkulose  
 MRGN Multiresistente Gram-negative Stäbchenbakterien  
 MRSA Methicillin resistenter *Staphylococcus aureus*

**Isolierungsschema UMR** (siehe auch Hygiene-Merkblätter UMR)

	<b>Offene Tbc</b>	<b>CDAD</b>
<b>Isolierung</b>	Bereits bei Verdacht erforderlich	In der Regel beim Auftreten klinischer Symptome notwendig. Ein Verzicht auf die Isolierung ist mit der Krankenhaushygiene abzusprechen und ist abhängig von der Anwesenheit von Risikopatienten auf der betroffenen Station. Eigene Toilette/Toilettenstuhl!
<b>Kohortierung</b>	<b>Nicht</b> möglich	Möglich
<b>Entisolierung</b>	Nach Vorliegen von 3, innerhalb einer Woche gewonnenen, negativen Sputumpräparaten Entscheidung durch behandelnden Arzt	48 Stunden nach Abklingen klinischer Symptome
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Standard	<b>Nach</b> HHD Hände waschen!
<b>Keimarme Handschuhe</b>	Standard	Standard
<b>Mund-Nasen-Schutz Atemmasken</b>	Vor Betreten des Patientenzimmers: FFP2-Maske Bei <b>multiresisten</b> Stämmen: FFP3-Maske	Keine
<b>Schutzkittel</b>	Vor Betreten des Patientenzimmers	Bei Kontakt mit erregerehaltigem Material, mit kontaminierten Gegenständen oder mit der erkrankten Person
<b>Flächendesinfektion</b>	Konzentration 2 %	Sporizides Desinfektionsmittel
<b>Wäsche</b>	„Infektiöse Wäsche“	Entsorgung im Zimmer
<b>Geschirr</b>	Standard	Aufbereitung beim Caterer <b>Bei Ausbrüchen:</b> Einweggeschirr
<b>Medizinprodukte</b> (z. B. Pflege-, Untersuchungsmaterial)	Patientenbezogen einsetzen Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen	Patientenbezogen einsetzen Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen
<b>Abfall</b>	<b>"Infektiöses"</b> Material: Entsorgung als Abfall der Gruppe C in blauer Tonne	Normale Entsorgung

HMB Hygienemerklblatt  
HHD Hygienische Händedesinfektion  
CDAD *Clostridioides difficile* assoziierte Diarrhoe

Tbc Tuberkulose  
MRGN Multiresistente Gram-negative Stäbchenbakterien  
MRSA Methicillin resistenter *Staphylococcus aureus*

**Isolierungsschema UMR** (siehe auch Hygiene-Merkblätter UMR)

	<b>Influenza</b>	<b>Viral bedingte Enteritiden</b> (z. B. Noro, Rota, Adeno)
<b>Isolierung</b>	Bereits bei Verdacht erforderlich	Bereits bei Verdacht erforderlich
<b>Kohortierung</b>	Möglich	Möglich
<b>Entisolierung</b>	In der Regel nach 5 Tagen (siehe HMB)	48 Stunden nach Abklingen klinischer Symptome
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Standard	Viruzides Desinfektionsmittel! z. B. Desderman pure; Einwirkzeit: 30 Sekunden
<b>Keimarme Handschuhe</b>	Standard	Standard
<b>Mund-Nasen-Schutz Atemmasken</b>	Bei Umgang mit Verdachtsfällen bzw. infizierten Patienten: Chirurgische Maske;  Bei Tätigkeiten mit Aerosolbildung: FFP2-Maske	Erforderlich
<b>Schutzkittel</b>	Bei Betreten des Patientenzimmers	Bei Kontakt mit erregerehaltigem Material, mit kontaminierten Gegen- ständen oder mit der erkrankten Person
<b>Flächendesinfektion</b>	Standard	Viruzides Desinfektionsmittel
<b>Wäsche</b>	"Infektiöse" Wäsche"	"Infektiöse" Wäsche"
<b>Geschirr</b>	Standard	<b><u>Bei Ausbrüchen</u></b> Aufbereitung beim Caterer oder auf Station mit Gewerbegeschirrspüler bei 93 °C
<b>Medizinprodukte</b> (z. B. Pflege-, Untersuchungsmaterial)	Patientenbezogen einsetzen Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen	Patientenbezogen einsetzen Nach Gebrauch aufbereiten bzw. entsorgen
<b>Abfall</b>	Normale Entsorgung	Normale Entsorgung

HMB  
HHD  
CDADHygienemerktblatt  
Hygienische Händedesinfektion  
*Clostridioides difficile* assoziierte DiarrhoeTbc  
MRGN  
MRSATuberkulose  
Multiresistente Gram-negative Stäbchenbakterien  
Methicillin resistenter *Staphylococcus aureus*