

Hygienemaßnahmen beim Transport von Patienten mit potentiell übertragbaren Erregern

Allgemeines

- **Überleitungsbogen** für Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE) beachten!
- **Hygienemerkbblätter** der UMR beachten!
- Zieleinrichtung vor dem Transport informieren!
- Patienten mit hier **nicht namentlich aufgeführten Erregern bzw. Erkrankungen** werden unter strikter Einhaltung von Standard-Hygienemaßnahmen transportiert.
- **Stark immungeschwächte Patienten** werden zum Schutz ihrer Gesundheit grundsätzlich **nicht** zusammen mit anderen Patienten transportiert.

Maßnahmen

Erreger/Erkrankung	Sammeltransport	Schutzkittel	Handschuhe	Mund-Nasen-Schutz
<i>Clostridioides difficile</i>	Ja	Ja	Standard	Keine
Gastroenteritis (z. B. Noroviren, Rotaviren)	Ja	Ja	Standard	Ja
Influenza		Ja	Standard	FFP2-Maske
Keuchhusten (Pertussis)		Ja	Standard	Ja
Masern		Ja	Standard	Ja
Meningokokken- Meningitis		Ja	Standard	Ja
MRSA	Ja	Gegebenenfalls	Standard	Gegebenenfalls
Multiresistente Erreger (3/4 MRGN)	Nur 3 MRGN	Gegebenenfalls	Standard	Gegebenenfalls
Windpocken (Varizellen)		Ja	Standard	Ja
Offene Tuberkulose		Ja	Standard	Siehe Erklärungen
COVID-19		Ja	Standard	mind. FFP2

Hygienemaßnahmen beim Transport von Patienten mit potentiell übertragbaren Erregern

Erreger/Erkrankung	Hände-Desinfektion	Flächen-Desinfektion	Abfall	Wäsche
<i>Clostridioides difficile</i>	1. Desinfizieren 2. Waschen	Sporizides Mittel	Standard	Standard
Gastroenteritis (z. B. Noroviren, Rotaviren)	Viruzides Mittel	Viruzides Mittel	Standard	Infektiös
Influenza	Standard	Routinemäßig	Standard	Infektiös
Keuchhusten (Pertussis)	Standard	Routinemäßig	Standard	Standard
Masern	Standard	Routinemäßig	Standard	Standard
Meningokokken-Meningitis	Standard	Routinemäßig	Standard	Standard
MRSA	Standard	Routinemäßig	Standard	Standard
Multiresistente Erreger (3/4 MRGN)	Standard	Routinemäßig	Standard	Standard
Windpocken (Varizellen)	Standard	Routinemäßig	Standard	Standard
Offene Tuberkulose	Standard	Routinemäßig	Infektiös	Infektiös
COVID-19	Standard	Routinemäßig	Standard	Infektiös

Erklärungen

Durchführung der Händedesinfektion	
Standard	Siehe Basishygieneordnung/Händehygiene
Tragen eines Schutzkittels	
Ja = Standard	Bei möglichem Kontakt zu infektiösem Material
Gegebenenfalls	Bei direktem Kontakt zum Patienten (z. B. Umlagern)
Tragen von Handschuhen	
Standard	Bei möglichem Kontakt zu infektiösen Material oder kontaminierten Gegenständen

Hygienemaßnahmen beim Transport von Patienten mit potentiell übertragbaren Erregern

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (M-N-S)	
Gegebenenfalls	Bei Erreger-Nachweis in Atemwegsekreten
Offene Tbc <i>Personal</i>	FFP2-Maske mit oder ohne Ausatemventil <u>FFP3-Maske bei multiresistenten <i>M.-tuberculosis</i>-Stämmen</u> Auf korrekten Sitz achten! Erhältlich über Geschäftsbereich Zentraleinkauf und Logistik (GB ZuL)
Offene Tbc <i>Patient</i>	Anlegen vor Verlassen des Zimmers Chirurgische Maske (geformt) Patienten, von denen ein spezielles Risiko ausgeht (Resistenzen und Multiresistenzen), tragen außerhalb des Isolationsraumes eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil
Entsorgung der Wäsche	
Infektiös	Entsorgung im Patientenzimmer Durchsichtigen Plastiksack mit Aufschrift " infektiös " verwenden Erhältlich im Wäschelager
Sammlung und Entsorgung von Abfall	
Standard	Keine besonderen Anforderungen aus infektionspräventiver Sicht "Krankenhausspezifische Abfälle" Abfallgruppe B
Infektiös	Besondere Anforderungen aus infektionspräventiver Sicht Abfallgruppe C Entsorgung in blauer Tonne
Flächendesinfektion	
Routine-desinfektion	Wischdesinfektion aller möglich kontaminierter Flächen