



Zusammenfassung: Änderungen Basishygieneordnung 2021

Basishygieneordnung	
Generell	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aus „keimarmen Handschuhen“ werden „Medizinische Einmalhandschuhe“ ○ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Bekleidungsordnung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nach Verlassen der Bereiche zur Behandlung von Notfällen (z. B. Einsatz im Schockraum) muss sich beim wieder Betreten des OP-Bereichs neu eingeschleust und entsprechend neu eingekleidet werden.
Gesundheits-schädlinge	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bei Sichtung von potentiellen Schädlingen erfolgt eine Meldung an die zentrale Disposition über Logbucheintrag bzw. Tel.: 6666
Händehygiene	<p>Bei Ekzemen an den Händen ist Kontakt mit dem Betriebsärztlichen Dienst aufzunehmen.</p> <p>Neu aufgenommen / siehe auch Hautschutzplan der UMR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hautschutzlotion- bzw. Hautpflegebalsam auf den Handrücken auftragen und zuerst Handrücken an Handrücken, dann die Handinnenflächen eincremen bzw. gründlich einmassieren. Beim Auftragen die Fingerzwischenräume und Nagelfalze nicht vergessen. <p><u>Vor Beginn und während der Arbeitszeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hautschutzlotion mehrmals täglich einreiben (leichte, schnell einziehende Öl-in-Wasser-Emulsion) <p><u>Vor Pausen und bei Arbeitsende</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pflegebalsam vor Pausen und am Arbeitsende auftragen (fetthaltige Wasser-in-Öl-Emulsion)
Periphere Arterielle Katheter (pAK)	<p>Wenn zum Verbandwechsel medizinische Einmalhandschuhe getragen werden, sind diese nach dem Anziehen zu desinfizieren; nach dem Ausziehen der Handschuhe erfolgt ebenfalls eine Hygienische Händedesinfektion</p>
Transfusionen	<p>Muss das Blut im Ausnahmefall über einen zentralen Katheter transfundiert werden, ist der Katheter zunächst mit 20 ml physiologischer Kochsalzlösung zu spülen, um eine Hämolyse/Gerinnungsaktivierung zu vermeiden.</p>



Zusammenfassung: Änderungen Basishygieneordnung 2021

Basishygieneordnung

Zentrale Venenkatheter	o Siehe Periphere Arterielle Katheter
-------------------------------	---------------------------------------

Hygienemerkbblätter

Clostridioides difficile	Bei Ausbrüchen mit <i>Clostridioides difficile</i> ist Einweggeschirr zu verwenden – Telefonnummern für die Bestellung von Einmalgeschirr sind verändert
Coronaviren	Wird laufend überarbeitet
MRSA	<p>Auch beim Personal können die Kontrollabstriche mit dem 1. Tag nach Beendigung einer Sanierungsbehandlung beginnen, Abnahme von 3 Kontrollabstrichen, von den vorher nachweislich besiedelten sowie den sanierten Bereichen im Abstand von ca. 4 Stunden (adäquat wie bei Patienten).</p> <p>Bei Patienten / Personal erfolgt 1x täglich eine antiseptische Ganzkörperwaschung (inklusive Haarwäsche) mit einer antimikrobiellen Waschlotion, z. B. Octenisan wash lotion – Waschlotion mindestens 1 min einwirken lassen – weitere Anwendungshinweise- siehe Herstellerangaben</p>

Spezielle Hygieneordnungen

Keine Änderungen

Formulare

Formular „Benachrichtigung zur Aufbereitung des Geschirrs über UMS GmbH“ :
o E-Mail Adresse wurde verändert