



Humanes Herpes Virus Typen 6 und 7 (HHV-6, HHV-7)

Verfahren	Nachweis von DNA
Indikation	<p>Primärinfektion HHV-6 (HHV-6B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Exanthema subitum ■ Roseola infantum ■ kritisches Dreitagefieber <p>Mögliche Komplikationen der Primärinfektion</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Entzündungen des Respirationstrakts ■ Entzündungen des Mittelohrs ■ Meningitis/Enzephalitis (selten) <p>Immunsupprimierte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ interstitielle Pneumonien nach Knochenmarkstransplantation ■ Abstoßungsreaktionen nach Nierentransplantationen <p>HHV-7</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ in der Regel symptomarmer oder asymptomatischer Verlauf
Material	<p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EDTA-Blut ■ Liquor ■ Respiratorische Sekrete
Methode	Quantitativer DNA-Nachweis im Real-Time-PCR-Verfahren
Lauris-Auftragserteilung	PCR Viren → Herpes Consensus PCR (HSV 1, HSV 2, VZV, HHV 6, EBV, CMV)
Weiterführende Informationen	Eine HHV-7-Diagnostik wird nicht angeboten.