



## Sexuell übertragbare Erreger des Urogenitaltrakts

<b>Verfahren</b>	Nachweis von DNA
<b>Indikation</b>	Sexuell übertragbare Infektionen des Urogenitaltrakts
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Urin</li> <li>■ Abstriche (Cervix uteri, Urethra)</li> </ul>
<b>Methode</b>	Qualitativer Nukleinsäure-Nachweis im Multiplex-Format im Real-Time-PCR-Verfahren
<b>Lauris-Auftragserteilung</b>	<p><b>PCR</b></p> <p>PCR/allgemeine Auftragsinformation → Multiplex-PCR STD (Sexually Transmitted Disease)</p>
<b>Weiterführende Informationen</b>	<p>Folgende Erreger können in der Multiplex-PCR nachgewiesen werden:</p> <p><b>Bakterien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Chlamydia trachomatis</i></li> <li>■ <i>Mycoplasma genitalium</i></li> <li>■ <i>Mycoplasma hominis</i></li> <li>■ <i>Neisseria gonorrhoeae</i></li> <li>■ <i>Ureaplasma parvum</i></li> <li>■ <i>Ureaplasma urealyticum</i></li> </ul> <p><b>Parasiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Trichomonas vaginalis</i></li> </ul>