

**Ureaplasma spp.**

Erreger	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Ureaplasma parvum</i>■ <i>Ureaplasma urealyticum</i>
Verfahren	Nachweis von DNA
Indikation	<ul style="list-style-type: none">■ Urethritis; gegebenenfalls Epididymitis, Orchitis, Pyelonephritis, Prostatitis, Zystitis■ Adnexitis, Syndrom der überaktiven Blase und interstitiellen Zystitis, Zervizitis
Material	<ul style="list-style-type: none">■ Erststrahlurin■ Urogenital-Abstriche (Urethra, Zervix)■ Vaginalsekret■ Ejakulat■ Prostatasekret
Methode	Qualitativer Nachweis von <i>U. urealyticum</i> - und <i>U. parvum</i> -DNA mittels Multiplex Real-time-PCR (STD Panel)
Lauris-Auftragserteilung	PCR / Allgemeine Auftragsinformation → Multiplex-PCR STD (Sexually Transmitted Disease)
Weiterführende Informationen	Bei Verdacht auf Chorioamnionitis oder Neu-/Frühgeborenen-Infektion (Pneumonien, Sepsis, Meningitis/Hirnabszess) bitte Rücksprache mit dem Labor halten.